

[HTTP://STUDENTI.SPZG.HR](http://studenti.spzg.hr)

• KORTIKOSTEROIDI •

Rp./ Beloderm ung.

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno premazati leziju

Rp./ Beloderm u orabazi

S. 3x1 premazati leziju kroz 7 dana

Rp./ Kenalog ung.

D. tub. orig. No. I

S. za premazivanje usnica i zavoje na sluznici

Rp./ Decortin tbl. a 40 mg

D. scat. orig. No. I

S. 1 tabletu dnevno popiti u jutro uz Gastal

Rp./ Medrol tbl. a 32 mg

D. scat. orig. No. I

S. 1 tabletu dnevno u jutro popiti uz Gastal

(**sistemski kortikosteroidi: 1 tblx 1 tjedan, $\frac{1}{2}$ tblx1 tjedan, $\frac{1}{4}$ tblx1 tjedan**)

Rp./ Maxidex gtts.

D. lag. orig. No. I

S. 3x5 kapi za usta promućkati i ispljunuti

Kortikosteroidi + salicilna kiselina

Rp./ Belosalic ung.

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno premazati leziju

Rp./ Locasalen ung.

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno premazati leziju

kortikosteroidi + antibiotici

Rp./ Dexamethason - Neomycin gtts.

D. lag. orig. No. I

S. 3x5 kapi promućkati i ispljunuti

Rp./ Dexamethason - Neomycin ungu.

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno za premazivanje usnica i zavoj na sluznici

Rp./ Geokorton ungu.

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno za premazivanje usnica i zavoj na sluznici

Rp./ Diprogenta ungu.

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno za premazivanje usnica i zavoj na sluznici

Rp./ Locacorten N ungu.

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno za premazivanje usnica i zavoj na sluznici

Rp./ Garasone gtts.

D. lag. orig. No. I

S. 4x5 kapi promućkati i ispljunuti

kortikosteroid + antibiotik + antimikotik

Rp./ Triderm ungu.

D. tub. orig. No. I

S. 3x1 premazati leziju

•ANTIMIKOTICI•

Rp./ Rojazol gel

D. tub. orig. No. II (duas)

S. 4x1/2 mjerne žlice promućkati i progutati kroz 14 dana

*Rojazol = Daktarin = Mikonazol

Rp./ Rojazol crema

D. tub. orig. No. I

S. 5xdnevno premazati kuteve usana

Rp./ Nistatin ung.

D. tub. orig. No. III (tres)

S. 3xdnevno premazati sluznicu usta

Rp./ Nistatin sol.

D. lag. orig. No. I

S. 3x30 kapi za usta kroz 14 dana

Rp./ Nistatin gtts.

D. lag. orig. No. I

S. 3x30 kapi promućkati i ispljunuti

Rp./ Diflucan tbl. a 50 mg

D. scat. orig. No. I

S. 1x1 tabletu popiti, kroz 14 dana (Diflucan = Flukonazol)

•ANTIVIRUSNA SREDSTVA•

Rp./ Virolex tbl. a 200 mg

D. scat. orig. No. I

S. 5x1, svaka 4 sata osim noću

Rp./ Virolex ung. a 200 mg

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno premazati leziju

Rp./ Aciclovir tbl.

D. scat. orig. No. I

S. 5x1, svaka 4 sata osim noću

Rp./ Aciclovir crema
D. tub. orig. No. I
S. 5xdnevno premazati leziju

•ANTISEPTICI•

Rp./ Corsodyl sol.
D. lag. orig. No. I
S. 3Xdnevno 1 mjericu razrijediti s 1 dL vode, za usta

Rp./ Belosept sol.
D. lag. orig. No. I
S. 3Xdnevno 1 mjericu razrijediti s 1 dL vode, za usta
*Belosept = Hexoral

Rp./ Strepsils past.
D. scat. orig. No. I
S. po potrebi otopiti 1 pastilu u ustima

Rp./ Septogal past.
D. scat. orig. No. I
S. po potrebi otopiti 1 pastilu u ustima

Rp./ Acidi Borici 3%
D.S. za protezu

•ANESTETICI•

Rp./ Xylocain spray
D. lag. orig. No. I
S. našpricati, za površinsku anesteziju

Rp./ Xylocain amp.
D. amp. orig. No. C (centrum)
S. ad manum medici

•ANTIBIOTICI•

Rp./ Silapen 1500 tbl.

D. scat. orig. No. I

S. 3x1, svakih 8 sati, 10 dana

Rp./ Amoxil caps a 500 mg

D. scat. orig. No. I

S. 3x1, svakih 8 sati

*Amoxil = Augmentin

Rp./ Sinersul tbl.

D. scat. orig. No. I

S. 2x2, svakih 12 sati

Rp./ Medazol tbl. a 400 mg

D. scat. orig. No. I

S. 3x1, svakih 8 sati

Rp./ Ceporex caps. a 500 mg

D. scat. orig. No. I

S. 4x1, svakih 6 sati

Rp./ Erythromycin caps. a 250 mg

D. scat. orig. No. I

S. 4x1, svakih 6 sati

Rp./ Byvacin gtts.

D. lag. orig. No. I

S. 3x5 kapi promućkati i ispljunuti

Rp./ Byvacin ung.

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno premazati leziju

Rp./ Sumamed caps. a 500 mg

D. scat. orig. No. I

S. 1xdnevno kroz 3 dana

Rp./ Dalacin C caps. a 150 mg

D. scat. orig. No. I

S. 4x1, svakih 6 sati

*Dalacin = Klindamicin

Rp./ Lysobact pastillae

D. scat. orig. No. I

S. 6xdnevno otopiti 1 pastilu u ustima

Rp./ Garasone gtts.

D. lag. orig. No. I

S. 3x5 kapi promućkati i ispljunuti

antibiotik + anestetik + antiseptik

Rp./ Lemocyn pastillae „Biochemie“

D. scat. orig. No. II (duas)

S. 3x1 pastilu otopiti u ustima

•ANTIKSEROSTOMICI•

Rp./ Glandosane spray „Fresenius“

D. lag. orig. No. I

S. po potrebi nasprejati usta

Rp./ Aldiamed gel

D. tub. orig. No. I

S. po potrebi 1 žlicu promućkati po ustima

Rp./ Radix Althaeae

D. scat. orig. No. I

S. 1 žlicu preliti sa 1 dL hladne vode, ostaviti preko noći, za ispiranje usta po potrebi

Rp./ Acidi Citrici 3,0

Glyceroli 3,0

Aquae purificatae ad 150,0

M.f. solutio

D.S. 3x1 žlicu, za usta

Rp./ Acidi Citrici 1% sol.

D. ad lag. a 200,0

S. 3-5xdnevno vlažiti usta

Rp./ Acidi Borici 1% sol.

D. ad lag. 200,0

S. 3-5xdnevno vlažiti usta

Rp./ Oralbalance gel
D. tub. orig. No. I
S. po potrebi, za usta

•VITAMINI•

Rp./ Plivit A gtts.
D. lag. orig. No. I
S. 3x10 kapi za usta (djeluje kao epitelizans)

Rp./ Plivit A gtts.
D. lag. orig. No. I
S. 3x30 kapi za usta (djeluje kao keratolitik)

Rp./ D-panthenol sol.
D. lag. orig. No. I
S. 3x30 kapi promućkati i ispljunuti

Rp./ D-panthenol crema
D. tub. orig. No. I
S. više puta dnevno premazati usnice

Rp./ Neurobion amp „Merck“
D. amp. orig. No. IX. (nonem)
S. ad manum medici

Rp./ B1 amp. orig. a 250 mg No. IV. (quatore)
B6 amp. orig. a 250 mg No. III. (tres)
B12 amp. orig. a 500 µg No. III. (tres)
D.S. ad manum medici

Rp./ Plibex dragees
D. scat. orig. No. I
S. 3x2 otopiti u ustima

•ANALGETICI•

Rp./ Aspirin tbl. „Bayer“
D. scat. orig. No. I
S. 1-2 tablete dnevno, protiv bolova

Rp./ Analgin tbl.
D. scat. orig. No. I
S. 1-3 protiv bolova

Rp./ Voltaren rapid
D. scat. orig. No. I
S. protiv bolova, do 6 dnevno

•ANTIISTAMINICI•

Rp./ Dimidril tbl.
D. scat. orig. No. I
S. 3x1 tabletu popiti

Rp./ Phenergan drag.
D. scat. orig. No. I
S. 3x1 dražeju popiti

Rp./ Claritine tbl.
D. scat. orig. No. I
S. 1x1 tabletu popiti

•IMUNOSTIMULATOR•

Rp./ Aloe vera inj.
D. amp. orig. No. X (decem)
S. ad manum medici, 2xtjedno, nakon 3 mj., te nakon 6 mj.

[HTTP://STUDENTI.SFZG.HR](http://STUDENTI.SFZG.HR)