

[HTTP://STUDENTI.SFZG.HR](http://studenti.sfzg.hr)

RECEPTI:

1. Stomatopyrosis

Rp. Neurobion amp

D. scat. orig. No. IX. (nonem)

S. ad manum medici

Rp. Rivotril tbl á 0,5 mg

D. scat.orig. No. I

S. 2 tablete popiti navečer prije spavanja

(konzultacije sa psihijatrom)

2. Aphtha maior

Rp. Belosept sol.

D. lag. orig. No. I

S. 3X dnevno 1 žlicu na 1 žlicu vode, za ispiranje usta

Rp. Beloderm ung. (u orabazi)

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno premazati leziju

Rp. Depo-Medrol amp á 40 mg

D. amp.orig. No I

S. Ad manum medici

→ (perilezijska instilacija Depo-Medrol 1x u 3 tjedna

0,1 ml (4mg) Depo-Medrol + 0,4 ml anestetika bez adrenalina + 0,5 ml aquae destillatae)

3. Aphthae minores (u većem broju)

Rp. Maxidex gtt.

D. lag. orig. No. I

S. 3X5 kapi dnevno promućkati u ustima i ispljunuti

Rp. Nistatin gtt.

Belosept sol.

Lidokain sprej

D-panthenol sol.

Koktel.

S. 3xdnevno 1 žlicu promućkati u ustima i ispljunuti

S. Ad manum medici

4. Aphthae herpetiformes

Rp. Nistatin gtt.

Belosept sol.

Lidokain sprej

D-panthenol sol.

Koktel.

S. 3xdnevno 1 žlicu promućkati u ustima i ispljunuti

S. Ad manum medici

Lokalno →

Rp. Maxidex gtt.

D. lag. orig. No. I

S. 3X5 kapi dnevno promućkati u ustima i ispljunuti

Kod jake kliničke slike → Rp. Decortin tbl. á 40 mg

D. scat. orig. No. I

S. 1 tabletu dnevno. Popiti ujutro uz Gastal

5. Xerostomia

Rp. Aldiamed gel

D. tub. orig. No. I

S. po potrebi 1 žlicu promućkati u ustima ili premazati desni.

(ili: Rp. Glandosane spray

D. scat. orig. No. I

S. Umjetna slina. Po potrebi nasprejati usta)

Rp. Radicis Althaeae

D. scat. orig. No. I

S. 1 žlicu preliti sa 1 dL hladne vode, ostaviti preko noći, za ispiranje usta po potrebi

Rp. Aminfluorid gel

D. tub. orig. No. I

S. svaki drugi dan četkati zube. Ne ispirati.

6. Leukoplakia

Rp. Roaccutane caps á 10 mg (u orabazi)

D. scat. orig. No. I

S. Ad manum medici

(2x dnevno, kontrola za 2 tjedna)

(Rp. Belosalic ung. (u orabazi)

D. tub. orig. No. I

S. 3X dnevno. Izvana za mazanje lezije

Rp. Plivit A gtt.

D. lag. orig. No. I

S. 3x30 kapi promućkati u ustima i ispljunuti)

7. Gingivostomatitis herpetica (3. dan od početka prvih simptoma)

Rp. Virolex tbl. á 200 mg

D. scat. orig. No. I

S. 5x1, svaka 4 sata osim noću

Rp. Nistatin gtt.

Belosept sol.

Lidokain sprej

D-panthenol sol.

S. Ad manum medici

Koktel.

S. 3xdnevno 1 žlicu promućkati u ustima i ispljunuti

Rp. Centravit tbl.
D. scat. orig No. I
S. 1X1

8. Gingivostomatitis herpetica (kasnija faza: npr. 7. dan nakon početka bolesti)

Rp. Nistatin gtt. }
Belosept sol. }
Lidokain sprej }
D-panthenol sol. }
S. Ad manum medici Koktel.
S. 3xdnevno 1 žlicu promućkati u ustima i ispljunuti

9. Herpes simplex reccurens palati duri/gingivae

Rp. Aclovir ung.
D. tub. orig. No. I
S. 6X dnevno, svaka 2 sata premazati lezije

10. Herpes simplex reccurens labiorum (1. dan)

Rp. Virolex crem.
D. tub. orig. No. I
S. 6X dnevno premazati leziju

11. Lichen ruber planus reticularis (mirna faza)

→ terapija nije potrebna u mirnoj fazi

→ ako postoje blagi simptomi :

Rp. Lemocyn pastillae

D. scat. orig. No. I

S. 3x dnevno, ½ pastile otopiti u ustima

12. Gingivitis desquamativa (u sklopu bolesti Lichen ruber erosivus)

Rp. Gengigel gel

D. tub. orig. No I

S. 3x dnevno jednakomjerno nanosite na desni i čistim prstima blago utrljajte

Rp. Beloderm ung. (u orabazi)

D. tub. orig. No. I

S. 3xdnevno premazati leziju

Rp. Belosept sol.

D. lag. orig. No. I

S. 3X dnevno 1 žlicu na 1 žlicu vode, za ispiranje usta

(+ održavati dobru oralnu higijenu!)

13. *Ulcus decubitale*

Rp. Belosept sol.

D. lag. orig. No. I

S. 3X dnevno 1 žlicu na 1 žlicu vode, za ispiranje usta

Rp. Beloderm ung.

D. tub. orig. No. I

S. 3X na dan za mazanje lezija

14. *Palatitis prothetica*

Rp. Acidi borici 3%

D.S. za protezu

Rp. Belosept sol.

D. lag. orig. No. I

S. 3X dnevno 1 žlicu na 1 žlicu vode, za ispiranje usta

Rp. Rojazol gel

D. tub. orig. No. II (duas)

S. 4X dnevno ½ mjerne žličice promućkati u ustima i progutati

(pacijenti s kontraindikacijama (poremećaj jetrene funkcije, ??) - ispljunuti)

15. Candidiasis pseudomembranacea

Rp. Belosept sol.

D. lag. orig. No. I

S. 3X dnevno 1 žlicu na 1 žlicu vode, za ispiranje usta

Rp. Nistatin gtt.

D. lag. orig. No. I

S. 3X30 kapi promućkati u ustima i ispljunuti

16. Ulcus traumaticum

Rp. Belosept sol.

D. lag. orig. No. I

S. 3X dnevno 1 žlicu na 1 žlicu vode, za ispiranje usta

Rp. Beloderm ung.

D. tub. orig. No. I

S. 3X na dan za mazanje lezija

17. Cheilitis angularis

Rp. Belosept sol.

D. lag. orig. No. I

S. 4X dnevno 1 žlicu na 1 žlicu vode, za ispiranje usta

Rp. Rojazol gel

D. tub. orig. No. II (duas)

S. 4X dnevno ½ mjerne žličice promućkati u ustima i progutati

(pacijenti s kontraindikacijama (poremećaj jetrene funkcije, ??) - ispljunuti)

Rp. Rojazol crem.

D. tub. orig. No. I

S. 4X dnevno premazati lezije

Ako terapija ne pomaže → Rp. Triderm crem.

D. tub. orig. No. I

S. 3x1 premazati leziju

18. Pemphigus

Rp. Nistatin gtt.

Belosept sol.

Lidokain sprej

D-panthenol sol.

S. Ad manum medici

Koktel.

S. 3xdnevno 1 žlicu promućkati u ustima i ispljunuti

Rp. Maxidex gtt.

D. lag. orig. No. I

S. 3X5 kapi dnevno promućkati u ustima i ispljunuti

(ili: Beloderm u orabazi , Dexamethason-Neomycin gtt)

Pacijenta upućujemo dermatologu.

Rp. Decortin tbl. á 40 mg

D. scat. orig. No. I

S. 1 tabletu dnevno. Popiti ujutro uz Gatal

19. Pemphigoid

Rp. Maxidex gtt.

D. lag. orig. No. I

S. 3X5 kapi dnevno promućkati u ustima i ispljunuti

Rp. Nistatin gtt.

Belosept sol.

Lidokain sprej

D-panthenol sol.

S. Ad manum medici

Koktel.

S. 3xdnevno 1 žlicu promućkati u ustima i ispljunuti

<http://studenti.sfzg.hr>
